

AVERTISSEMENTS



AGRICOLLES

LORRAINE GRANDES CULTURES

Bulletin n° 4 du 5 mars 1997

Colza

Charançon de la tige

Le vol se poursuit sur des colzas qui reprennent vigueur

| Lieu | Date | Nbre de captures en cuvette jaune |
|------------------------|------|-----------------------------------|
| Crantenoy (54) | 28.2 | 5 |
| Crantenoy (54) | 04.3 | 1 |
| Velaine en Haye (54) | 28.2 | 4 |
| Silly-en-Saulnois (57) | 27.2 | 8 |
| Euville (55) | 24.2 | 3 |
| Demange-aux-E. (55) | 26.2 | 8 |
| Bouée (55) | 24.2 | 10 |
| Méliny (55) | 24.2 | 15 |
| Méliny (55) | 01.3 | 20 |
| Vaux-la-Petite (55) | 24.2 | 25 |
| Vaux-la-Petite (55) | 01.3 | 6 |
| Brehéville (55) | 01.3 | 13 |
| Neufchâteau (88) | 02.3 | 3 |

Les traitements peuvent être effectués cette semaine dans la majorité des secteurs.

Dégâts de pigeons

Des dégâts parfois importants nous ont été signalés avec disparition de pieds de jeunes colzas (nord de la Lorraine)

Aucun traitement chimique n'est actuellement adapté à ce type d'attaque. Se rapprocher de la Fédération des Chasseurs qui peut éventuellement demander un permis de chasse exceptionnel, limité dans le temps, et sur une aire géographique bien définie.

Un réseau de stations météorologiques automatiques

Pour l'élaboration des Avertissements Agricoles, le Service de la Protection des Végétaux dispose désormais des données recueillies par un réseau de 16 stations météorologiques automatiques (voir carte), une 17ème sera mise en place dans les semaines à venir sur un site restant à définir. Les paramètres climatiques enregistrés heure par heure dans chacune de ces stations sont récupérés quotidiennement par le SRPV et alimentent des modèles de prévision d'évolution des maladies (TOP, piétin verse), PRESEPT (septoriose), tavelure du mirabellier, feu bactérien en cultures fruitière et ornementales, et d'insectes (pyrale du maïs, carpocapse des cultures fruitières). Elles permettent, en outre, d'étudier et de mettre au point de nouveaux modèles de prévision (maladies du colza) et d'anticiper sur l'arrivée de nombreux insectes ou le développement de certains champignons ou de procéder à des comparaisons utiles entre années ou entre postes. Le nombre et la répartition de ces postes permettent de couvrir la grande majorité du territoire de la région et de différencier les diverses zones climatiques.

Les messages d'Avertissements élaborés par notre service deviennent ainsi de mieux en mieux adaptés à chacun des secteurs géographiques en vous permettant d'améliorer vos performances techniques et économiques.



Traiter les charançons de la tige du colza.

Un réseau de stations météorologiques à votre service.



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT



SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51

ABONNEMENT ANNUEL 370 F

Une innovation sera adoptée cette année en liaison avec ce réseau de stations : dans chaque bulletin apparaîtront, outre les résultats des modèles accompagnés des commentaires les mieux appropriés

à la situation, un tableau récapitulatif des précipitations cumulées depuis le précédent bulletin. Ce renseignement supplémentaire vous permettra de situer avec davantage de précision, no-

tamment en période orageuse, votre secteur immédiat par rapport à une station repère plus ou moins éloignée. Nous espérons ainsi répondre à l'interrogation légitime d'un certain nombre d'abonnés.

STATIONS METEOROLOGIQUES

AUTOMATIQUES

SUIVIES PAR LE S.R.P.V.

EN 1997

